

Каравай П.А., Малевич Ю.К.,
Слижевская Т.И.

СИФИЛИС И БЕРЕМЕННОСТЬ

/ Минск /

Учитывая тенденцию к увеличению заболеваемости сифилисом на протяжении нескольких последних лет, мы решили проследить особенности и характер течения беременности у женщин, больных или бывших в контакте с данной венерической инфекцией.

Проведя анализ 186 историй родов, произошедших в специализированном отделении 3-й городской клинической больницы г.Минска, выяснено, что в 80 случаях сифилис был выявлен во время беременности.

По паритету беременности в 95 случаях она была первой, а в 91 случае — повторной. По паритету родов в 143 случаях это были первые, а в 50 — повторные. Почти у половины исследуемых больных родам сопутствовали самопроизвольные и медицинские аборт. Так, в 17 случаях имели самопроизвольные, а в 59 — произведены медицинские аборт. Обращает внимание, что в 10 случаях была зафиксирована антенатальная гибель плода. Что в свою очередь составило 5,4% от всех родов в данной исследуемой группе.

Анализируя характер течения беременности, было обнаружено, что в 110 случаях из 186 имели место осложнения беременности. Так, угроза прерывания беременности зафиксирована в 57 случаях, нефропатия беременных — в 28, водянка беременных — в 23, пиелонефрит беременных выявлен в 20 случаях, ранний токсикоз — в 3 случаях, а сепсис — в 1 случае.

Изучая влияние сифилиса на течение беременности и родов, мы исследовали также и сопут-

ствующие экстрагенитальные заболевания, которые могли в той или иной мере повлиять на течение и исход беременности в данной исследуемой группе больных.

Было выявлено, что сопутствующие экстрагенитальные заболевания имели 129 женщин из 186 исследуемых. Из них заболевания сердечно-сосудистой системы — у 13 человек, острые респираторные и заболевания дыхательной системы — у 50, болезни мочевыделительной системы — у 21 женщины, миопия — у 34, ЛОР-болезни имели 14 исследуемых, анемии беременных — в 109 случаях, болезни желудочно-кишечного тракта выявлены у 8 больных, эндокринные заболевания прослежены у 40 беременных, варикозное расширение вен — у 3 больных, кожные болезни обнаружены у 6 женщин, носительство патогенной флоры отмечено у 11 человек, заболевания других нозологических групп отмечены у 8 больных, сочетание двух и более заболеваний отмечено в 100 случаях.

Анализируя данные о перенесенных ранее заболеваниях получены следующие результаты: гинекологическими заболеваниями ранее страдали 108 женщин, хирургическим вмешательствам подверглись 44, болезнь Боткина отмечена в 20 случаях, а частыми простудными болеют 43 человека, болезни других нозологических групп имели место в 15 случаях.

Таким образом, можно сделать вывод, что сифилис является частой причиной прерывания беременности и антенатальной гибели плода, в то же время частота осложнений беременности и родов, количество экстрагенитальных заболеваний, за исключением анемий, существенно не отличается от общего процента популяции.